



Survol des indicateurs du taux de tabagisme au Québec

(Mis à jour en octobre 2013)

- 1) **l'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC)**
de Santé Canada (1999 – 2012, enquête discontinuée)
- 2) **l'Enquête sur les habitudes tabagiques des Québécois (EHTQ)**
de l'Institut de la statistique du Québec (2010)
- 3) **l'Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES)**
de l'Institut de la statistique du Québec (1998 – 2008, enquête discontinuée)
- 4) **l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)**
de l'Institut de la statistique du Québec (2010)
- 5) **l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ)**
de Santé Canada (2006 -2012)
- 6) et **l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)**
de Santé Canada (2003 - 2012).



** Les taux de tabagisme diffèrent d'une enquête à l'autre en raison des différentes tailles d'échantillon et des méthodologies utilisées (ex. : définition de « fumeur » et tranches d'âge).*

1 ► Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC)ⁱ

L'ESUTC est l'enquête la plus ancienne. Elle fournit des données sur la consommation de cigarettes chez les **15 ans et plus** sur des bases annuelle depuis 1998. Pour une année complète, l'échantillon québécois de l'ESUTC comprend quelque 2000 répondants du Québec.ⁱⁱ Malheureusement, l'enquête est maintenant discontinuée. Les données de 2012 sont les dernières.

CIGARETTE :

Selon l'ESUTC, le taux de fumeurs (cigarettes, 15 ans +) au Québec est passé de 34 % en 1998 à 22 % en 2005 et n'a pas changé d'un point de vue statistique depuis 2006 (avec le même taux - 20 % - en 2006 qu'en 2011). L'analyse des intervalles de confiance démontre qu'il n'y a pas eu de variations statistiquement significatives depuis 2006 et, ce, autant au niveau de la population générale (15 ans et plus) qu'auprès des jeunes (15 à 19 ans)ⁱⁱⁱ.



CIGARE :

L'Enquête de 2012 révèle que 6 % des jeunes canadiens de 15 à 19 ans déclarent avoir fumé un produit du cigare au cours des 30 derniers jours, un taux statistiquement équivalent à celui de 2009. L'Enquête de 2011 avait montré que plus de 80% de ces produits sont en fait des petits cigares ou cigarillos.^{iv} En 2011, 37,5 % des jeunes Québécois de 15 à 19 ans avaient essayé le cigarillo, la plus haute proportion de toutes les provinces (moyenne des 9 autres : 25,5 %).^v

TABLE 10.2: PERCENTAGE OF YOUTH AGED 15-19 WHO HAD EVER TRIED VARIOUS TOBACCO PRODUCTS, BY PROVINCE, 2011

PROVINCE	Cigarillos	Cigars	Pipe	Chewing tobacco/snuff	Waterpipe
CANADA	26.9%	16.9%	5.3%	5.2%	12.3%
BRITISH COLUMBIA	23.6	15.1	!	!	9.3
ALBERTA	26.1	15.9	!	7.2	15.2
SASKATCHEWAN	32.4	20.8	8.3	17.4	9.1
MANITOBA	27.2	15.7	6.4	7.3	5.9
ONTARIO	22.0	15.3	!	!	11.2
QUEBEC	37.5	20.9	!	!	17.9
NEW BRUNSWICK	29.7	18.9	6.6	6.8	5.2
NOVA SCOTIA	24.8	17.1	7.6	7.8	7.4
PRINCE EDWARD ISLAND	20.4	15.9	9.4	11.9	8.9
NFLD. & LABRADOR	23.7	12.4	!	!	!

! DATA NOT REPORTABLE DUE TO LOW NUMBERS IN THE NUMERATOR AND/OR DENOMINATOR
DATA SOURCE: CTUMS, 2011

2 ► Enquête sur les habitudes tabagiques des Québécois (EHTQ)^{vi}

CIGARETTE :


L'EHTQ est une enquête menée sur une base annuelle depuis 2010 par l'Institut de la statistique du Québec sur un échantillon ciblé (3150 répondants) représentatif des fumeurs et des non-fumeurs de cigarettes dans la population québécoise âgée de 15 ans et plus.

Selon l'EHTQ, le taux de tabagisme n'a pas changé, statistiquement parlant, entre 2010 (20 %) et 2011 (19 %). En 2011, 19 % de la population québécoise fumait la cigarette, dont 14 % à tous les jours ou presque. 20 % des fumeurs sont âgés de 15 à 24 ans.

3 ► Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES)^{vii}

Depuis 1998, l'ETADJES de l'Institut de la statistique du Québec sonde à tous les deux ans près de 4000 à 5000 élèves de secondaire I à V.^{viii}

Selon l'ETADJES, le taux de tabagisme (cigarettes seulement) chez les élèves du secondaire est passé de 30,4 % en 1998 à près de 15 % en 2006, pour demeurer à ce niveau en 2008. Or, le taux de tabagisme qui tient compte des cigarettes et des cigarillos est de 22%.



Soulignons que les baisses du tabagisme (cigarettes) observées de 2002 à 2006 l'ont été alors que l'usage du cigarillo, lui, augmentait (de 15 % en 2002 à 22 % en 2006). Or, entre 2006 et 2008, le taux d'usage des **cigarillos** a diminué considérablement, passant de **21,6 % à 17,6 %**, alors que l'usage de la cigarette est resté plutôt stable. C'est donc dire qu'il y eût une baisse du tabagisme chez les élèves du secondaire entre 2006 et 2008.

Pour la première fois, l'enquête de 2008 fournit une vue qui combine l'usage de la cigarette et du cigarillo auprès des jeunes, et conclut que : « *les résultats révèlent que 15 % des élèves du secondaire fument la cigarette et que 18 % fument le cigarillo ou le petit cigare. C'est une proportion de 11 % qui combine la cigarette, le cigarillo ou le petit cigare, tandis qu'environ 3,9 % fument la cigarette seulement et 7 % fument uniquement le cigarillo ou le petit cigare. Si l'on tient compte à la fois de la consommation de la cigarette et de celle du cigarillo, on constate que c'est 22 % de l'ensemble des élèves qui fait usage du tabac.* »^{ix}

4 ► **Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)^x**

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) a réalisé en 2010-2011 une enquête générale de santé auprès de 63 196 jeunes des écoles secondaires du Québec afin de dresser des portraits régionaux comparables de leur état de santé physique, mentale et psychosociale, incluant leur consommation de cigarettes (mais pas de produits du cigares ni d'autres produits du tabac). Selon les auteurs, « les résultats de l'EQSJS ... ne sont pas directement comparables » aux résultats de l'ETADJES.

Selon l'**EQSJS 2010-11**, 4,1% des élèves du secondaire sont des fumeurs quotidiens, 2,8% font un usage occasionnel de la cigarette et 3,6% sont des fumeurs débutants. **Globalement, 6,9 % des élèves du secondaire sont des fumeurs actuels, c'est-à-dire qu'ils ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui ont fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours. L'Enquête ne tient pas compte de l'usage de cigares/cigarillos.**

5 ► **Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ)^{xi}**

Financée par Santé Canada, l'Université de Waterloo mène depuis plusieurs années une enquête pancanadienne concernant divers comportements à risque, dont les habitudes tabagiques des élèves du secondaire. L'enquête de 2010/11 a sondé 4 266 élèves au Québec, de la 6^e année du primaire à la 5^e du secondaire.^{xii}

Selon l'**ETJ-2010/11**, **6 % des élèves au Québec fument la cigarette** (le même taux qu'en 2006/7).

De plus, **23 % des élèves ont essayé le cigare/cigarillos en 2010/2011** comparativement à 26 % en 2006/7.

CIGARETTE :

Selon l'**ETJ-2010/11**, **6 % des élèves québécois fument la cigarette^{xiii}**, ce qui représente un retour au taux de 2006/7 (6 %)^{xiv} suite à la hausse observée en 2008/9 (10 %).^{xv} [Élèves de la 6^e année du primaire au sec. V qui ont déjà fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et ont fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours.]


ESSAI (CIGARETTE) :

Près du tiers (31 %) des élèves québécois déclarent « avoir essayé » la cigarette, comparativement à la moyenne canadienne de 26 %. **24,4 % des élèves les plus jeunes (de la 6^e année au secondaire III) ont fait l'essai de cigarettes en 2010/11, un taux trois fois plus élevé qu'en Ontario.^{xvi}** (voir graphique)

PRODUITS AROMATISÉS :

Parmi les élèves québécois ayant consommé du tabac au cours des 30 derniers jours, **65 % ont rapporté avoir consommé au moins une fois un produit aromatisé, soit la proportion la plus élevée de toutes les provinces canadiennes.^{xvii}**

FIGURE 7.3: PERCENTAGE OF STUDENTS IN GRADES 6-9 WHO HAD EVER TRIED SMOKING A CIGARETTE, BY PROVINCE*, 2010-11




DATA SOURCE: YSS, 2010-11

*IN 2010-11, NEW BRUNSWICK DECLINED PARTICIPATION IN THE YSS.

ESSAI (CIGARE) :

Selon l'ETJ-2010/11, **23 % des élèves québécois disent avoir essayé des produits du cigare en 2010/2011, comparativement à 26 % en 2006^{xviii} et 31 % en 2007/8** (voir graphique). **Si on s'attarde seulement aux élèves en secondaire III à V, c'est 43 % d'entre eux qui ont fait l'essai des cigares/cigarillos en 2010/11.** Enfin, parmi toutes les provinces, c'est au Québec que ces produits sont les plus populaires auprès des jeunes, avec 23 % des élèves au Québec qui disent les avoir essayés alors que ce taux est de 17 % à l'échelle nationale.^{xix}


Ainsi les données de l'ETJ-2010/11 confirment que, bien que la consommation ait baissé depuis 2008, les produits aromatisés, et plus spécifiquement les cigarillos et cigares, demeurent très populaires auprès des élèves québécois et ce, malgré l'entrée en vigueur en juillet 2010 de l'interdiction fédérale des additifs aromatisants (à l'exception du menthol) dans les cigarillos.



6 ► Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)


L'ESCC sonde quelque 25 000 répondants au Québec.^{xx} Il s'agit de l'enquête la plus précise sur la population générale (12 ans et plus) quant à la consommation de cigarettes, mais elle ne tient pas compte de l'usage des cigares/cigarillos.

Selon l'ESCC, le taux de tabagisme (cigarettes seulement) au Québec en 2012 (24,4 %) n'est pas différent, au sens statistique, de celui de 2005 (23,8 %).^{xxi}



Géographie ^{2,3} =Québec [24] ² Groupe d'âge =Total, 12 ans et plus Sexe =Les deux sexes Indicateurs =Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion ^{28,29,30,31,33}								
Caractéristiques ^{50,51,52,53,54,71,84,87}	2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre de personnes	1 646 853	1 577 008	1 650 863	1 542 295	1 499 501	1 570 677	1 428 422	1 626 375
Pourcentage	26,0	24,4	25,1	23,3	22,5	23,3	21,0	23,8
Limite inférieure de l'intervalle de confiance de 95 %, pourcentage (pourcentage)	25,1	23,7	23,9	22,1	21,3	22,1	19,8	22,4
Limite supérieure de l'intervalle de confiance de 95 %, pourcentage (pourcentage)	26,8	25,1	26,3	24,5	23,7	24,6	22,3	25,2

Pour des fins de comparaison entre les sous-populations par groupes d'âge, il est recommandé — compte tenu des marges d'erreur — de se limiter aux données d'un cycle de deux ans.^{xxii} Au moment de la mise à jour de ce document, les données pour le cycle 2011-2012 n'étaient pas encore disponibles.



Références :

- ⁱ **Santé Canada**. Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC), 1999-2012, Tableaux supplémentaires – Annuel, tableau 2 http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2012/ann-fra.php#t2 et Aperçu général des données historiques, 1999-2012, tableau 2 : http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2012/ann-histo-fra.php#tab2
- ⁱⁱ **Santé Canada**. Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC), 2012, tableau 13. http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2012/ann-fra.php
- ⁱⁱⁱ Par exemple, pour les jeunes Québécois de 15 à 19 ans, le taux de tabagisme en 2006 (18.3 %) avait un intervalle de confiance de [15.0-21.7] et le taux de 2012 (13.4 %) avait un intervalle de confiance de [10.1-16.7].
- ^{iv} http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2011/ann_summary-sommaire-fra.php
- ^v Tableau: Données de l'ESUTC -2011 présentées dans « Tobacco Use in Canada : Patterns and Trends, 2013 Edition », PROPEL Center for Populational Health Impact, Université de Waterloo. <http://www.tobaccoreport.ca/2013/>
- ^{vi} **Institut de la statistique du Québec**, « Zoom Santé : Enquête sur les habitudes tabagiques des Québécois : une étude portant sur les comportements méconnus face à un phénomène connu », mai 2012. http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2012/zoom_sante_no38.pdf
- ^{vii} **Institut de la statistique du Québec**. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008. http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2009/Tabac_alcool2008c3.pdf
- ^{viii} **Institut de la statistique du Québec**. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008, tableau 1.1. http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2009/Tabac_alcool2008c3.pdf
- ^{ix} **Institut de la statistique du Québec**. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008, page 184. http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2009/Tabac_alcool2008.pdf
- ^x **Institut de la statistique du Québec**. Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011 (EOSJS), octobre 2012. http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2012/EOSJS_tome1.pdf
- ^{xi} **Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo**. Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de 2010-2011. <http://www.yss.uwaterloo.ca/fr/?section=5&page=288>
- ^{xii} **Centre pour l'avancement de la santé des populations Propel de l'Université de Waterloo**. Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) : Guide de l'utilisateur des microdonnées de l'ETJ de 2010-2011. (voir tableau 8) http://www.yss.uwaterloo.ca/results/yss10_user_guide_french_ver3_20120424.pdf
- ^{xiii} **Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo**. « Results profile for Québec », Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de 2010-2011. (voir page 2) http://www.yss.uwaterloo.ca/results/yss10_EN_Provincial%20Report_QC_20120514.pdf
- ^{xiv} **Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo**. Les statistiques et les tendances du tabagisme de 2006-2007 au Québec, Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de 2006-2007. (voir page 5 du pdf) http://www.yss.uwaterloo.ca/results/etj06_rapport_provincial_QB.pdf
- ^{xv} **Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo**. Profil du tabagisme chez les jeunes du Québec, Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de 2008-2009. (voir page 3) http://www.yss.uwaterloo.ca/results/etj08_rapport_provincial_QB.pdf
- ^{xvi} Tableau: Données de l'ETJ -2010-11 présentées dans « Tobacco Use in Canada : Patterns and Trends, 2013 Edition », PROPEL Center for Populational Health Impact, Université de Waterloo, page 72. <http://www.tobaccoreport.ca/2013/>
- ^{xvii} **Enquête sur le tabagisme chez les jeunes**. Financée par Santé Canada et menée par l'Université de Waterloo (Centre pour l'avancement de la santé des populations Propel de l'Université de Waterloo). La dernière enquête a sondé 4 266 élèves au Québec de la 6^e année du primaire à la 5^e du secondaire. Tableau (extraction) du **Bureau d'intérêt public de la Société canadienne du cancer** (Ottawa). http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2013/DOCU_13_05_27_YSS_Pourcentage_ConsommateurTabac_Aromatise_PROV.pdf
- ^{xviii} **Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo**. Les statistiques et les tendances du tabagisme de 2006-2007 au Québec, Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de 2006-2007. (voir page 14 du pdf) http://www.yss.uwaterloo.ca/results/etj06_rapport_provincial_QB.pdf
- ^{xix} **Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo**. « Results profile for Québec », Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de 2010-2011. (voir page 11) http://www.yss.uwaterloo.ca/results/yss10_EN_Provincial%20Report_QC_20120514.pdf
- ^{xx} **Statistique Canada**, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Composante annuelle. "Information détaillée pour 2012", Échantillonnage de 65 000 pour le Canada: http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SurvId=3226&SurvVer=1&Instald=15282&InstaVer=9&SDDS=3226&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2#b2; et d'environ 25 000 au Québec: ESCC, "Guide de l'utilisateur - Fichiers de microdonnées de 2010 et 2009-2010" page 14, http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3226_D7_T9_V8-fra.pdf
- ^{xxi} **Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003-2012 de Statistique Canada**. Composante annuelle, tableau 105-0501: Profil d'indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires, et groupes de régions homologues. (Variable : fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion). http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2013/STAT_13_06_18_ESCC_TabagismeQc_IntervalleConfiance_2003_2012.jpg
- ^{xxii} **Institut de la statistique**, « Note méthodologique sur la pertinence de produire des estimations régionales à partir des données de la première année du cycle 2009-2010, novembre 2010. http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/doc_technique/Note_methodologique_ESCC.PDF