



FAITS SAILLANTS

Août 2014

Méfais

- **Le tabac est la première cause de décès évitables au Québec et dans le monde.**ⁱ Au Québec, il cause 10 400 décès par année.ⁱⁱ Le tabac tue deux fois plus que les décès causés par les suicides, les noyades, les accidents de la route, les dépendances, les meurtres, le SIDA et l'alcool réunis.ⁱⁱⁱ
- **La dépendance à la nicotine est aussi puissante que celle causée par l'héroïne.**^{iv} La plupart des fumeurs veulent arrêter mais n'y parviennent pas.
- **Le tabac tue près de la moitié de ses consommateurs.**^v
- **Le tabagisme est le principal facteur de risque des trois plus importantes causes de décès au Canada, soit le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires.**^{vi}

Taux

- **Le taux de tabagisme au Québec a connu une baisse statistiquement significative entre 2012 et 2013, passant de 23,8 à 21,4 %.**^{vii} Cette baisse suit la hausse de la taxe provinciale sur le tabac appliquée en novembre 2012 et survient suite à un taux globalement inchangé entre 2006 et 2012^{viii} alors que l'industrie du tabac parvenait à remplacer chaque client qui mourrait ou qui arrêtaient par un nouveau fumeur.
- **21 % des élèves de la 3^e à la 5^e année du secondaire au Québec ont fumé du tabac au cours des 30 derniers jours** (cigarettes, cigarillos, cigares ou chicha). Ce sont 15% qui fument uniquement la cigarette.^{ix}

Jeunes au Québec

- **L'âge moyen d'initiation au tabagisme chez les élèves du secondaire est de 12,7 ans.**^x
- **Chaque année, plus de 30 000 enfants et adolescents s'initient au tabagisme.**^{xi} (La grande majorité des jeunes consomment des produits légaux — non de la contrebande.^{xii})
- **C'est au Québec que la popularité des produits aromatisés est la plus élevée chez les jeunes Canadiens.** Par exemple, 59 % des élèves fumeurs de la 3^e à la 5^e année du secondaire ont consommé un produit aromatisé, contre 52 % à l'échelle canadienne et 46 % en Ontario.^{xiii}
- **Plus de 91 000 jeunes de 12 à 19 ans sont presque quotidiennement exposés à la fumée secondaire à bord d'une voiture.**^{xiv}

Coûts et profits

- **Le tabagisme est responsable du tiers (32,6 %) des coûts associés aux journées complètes d'hospitalisation au Québec.**^{xv}

- **Les cigarettiers encaissent au moins 6 millions \$/an de profits sur le dos des jeunes.** Les détaillants en encaissent 5,7 millions \$. Pour le Québec, c'est 2,5 M\$ et 1,7 M\$ respectivement.^{xvi} (Bon an, mal an, 15 % des détaillants au Québec vendent du tabac aux mineurs.^{xvii})
- **British American Tobacco** (maison-mère d'Imperial Tobacco, qui accapare 51 % du marché canadien^{xviii}) a fait **8,3 milliards \$ de profits en 2012**. Philip Morris International (maison-mère de Rothmans, Benson & Hedges) en a fait 8,8 milliards \$ et Japan Tobacco International (maison-mère de JTI-Macdonald) en a fait 3,3 milliards \$.^{xix}

Mesures législatives

- **Depuis décembre 2012, tous les produits du tabac en Australie doivent être vendus dans un emballage neutre et standardisé.** D'autres pays ont annoncé leur volonté de suivre l'exemple de l'Australie, dont la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Afrique du Sud et les Émirats Arabes Unis.^{xx, xxi, xxii} En Australie, le taux de tabagisme quotidien chez les personnes de 14 ans et plus a connu une baisse sans précédent, passant de 15,1% à 12,8% entre 2010 et 2013,^{xxiii} que les autorités de santé publique imputent à la mise en œuvre de la loi sur l'emballage neutre.^{xxiv}
- **L'Alberta a adopté une loi interdisant l'aromatisation du tabac** (qui attend d'être proclamée) et **l'Ontario s'apprête à le faire.**^{xxv}
- **Le Québec est la seule province à ne pas avoir légiféré pour interdire de fumer dans les voitures avec enfants.**^{xxvi}
- Une gamme de mesures anti-contrebande mises en œuvre au cours des dernières années ont **réduit la contrebande au Québec de plus du tiers du marché en 2008-09 à 14% depuis 2011.**^{xxvii}

Produits de tabac contemporains



Références

- ⁱ Organisation mondiale de la santé. <http://www.who.int/tobacco/mpower/package/fr/index.html>
- ⁱⁱ 10 414 en 2002: **Baliunas, D., et coll.**, « Mortalité et années potentielles de vie perdues en raison du tabagisme au Canada en 2002 : Conclusions tirées dans l'optique de la prévention et des politiques », *Maladies chroniques au Canada*, Vol. 27, no 4, 2007. http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cdic-mccc/27-4/pdf/cdic274-3_f.pdf
- ⁱⁱⁱ Au Canada et par année, il y a 37 000 décès causés par le tabac, 3 512 décès par suicide, 287 noyades, 2 500 décès par accident de la route, 1 695 à cause de drogues illégales, 610 meurtres, 428 décès dus au SIDA et 8 103 à l'alcool — en somme, 37 000 décès dus au tabac *versus* 17 135 dus à toutes ces causes combinées. (Sources : <http://www.ccsa.ca/2006%20CCSA%20Documents/ccsa-011332-2006.pdf>; <http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101026/dq101026a-fra.htm> (voir page 4); http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/prevention/bilan_routier_2012/bilan_routier.pdf; <http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201007/24/01-4300956-le-cancer-premiere-cause-de-mortalite-au-canada.php>)
- ^{iv} http://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/how_to_quit/you_can_quit/nicotine/
- ^v <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/fr/index.html>
- ^{vi} Site Web de la **Société canadienne du cancer**. (Facteur de risque : tabac). <http://goo.gl/dKRd3R>
- ^{vii} **Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003-2013 de Statistique Canada**. « Composante annuelle, tableau 105-0501: Profil d'indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires, et groupes de régions homologues. » (Variable : fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion.) http://cqct.gc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_06_27_ESCC_TabagismeQc_Variation_2003_2013.pdf
- ^{viii} **Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003-2013 de Statistique Canada**. Composante annuelle, tableau 105-0501: Profil d'indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires, et groupes de régions homologues. (Variable : fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion.) http://cqct.gc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_06_27_ESCC_TabagismeQc_Variation_2003_2013.pdf
- ^{ix} Tableau 3 de **Propel Center for Population Health Impact**, "Usage de produits du tabac aromatisés chez les élèves canadiens : données de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2010-2011", 7 octobre 2013. http://cqct.gc.ca/Documents_docs/DOCU_2013/TABAC_AROMATISES_ETJ_20131007.pdf
- ^x **Institut de la statistique du Québec**, *Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008*, page 52. http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/tabac_alcool.htm
- ^{xi} Environ 34 100 élèves sont des fumeurs débutants. **Institut de la statistique du Québec**, *Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2008* (page 45). <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2008.pdf>. Voir aussi **Coalition québécoise pour le contrôle du tabac**, *Calcul du nombre de nouveaux fumeurs*, septembre 2012. http://cqct.gc.ca/Documents_docs/DOCU_2012/DOCU_12_09_20_Calculs_No_NouveauxJeunesFumeurs.pdf
- ^{xii} **Coalition québécoise pour le contrôle du tabac**. *Les jeunes préfèrent les marques légales*, 2 octobre 2011. http://cqct.gc.ca/Documents_docs/DOCU_2011/DOCU_11_10_02_MarquesCigarettesDesJeunes_Legal_vs_contrebande.pdf
- ^{xiii} Tableau 4 de **Propel Center for Population Health Impact**, "Usage de produits du tabac aromatisés chez les élèves canadiens : données de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2010-2011", 7 octobre 2013. (L'enquête a sondé près de 51 000 élèves au Canada entre janvier et mai 2011, dont 4 266 au Québec.) http://cqct.gc.ca/Documents_docs/DOCU_2013/TABAC_AROMATISES_ETJ_20131007.pdf
- ^{xiv} **Statistique Canada, 2013**, « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Composante annuelle (ESCC) », tableau 105-0501: « Profil d'indicateurs de la santé, estimations pour une période de deux ans, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues ». Résultats : comparaisons de la réduction: http://cqct.gc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_06_17_ESCCJeunesFTSVoitureProvinces2007_2013.pdf
- ^{xv} Étude réalisée par le Groupe d'Analyse pour le compte de la CQCT. **Pierre-Yves Crémieux, Lisa Pinheiro, Marissa Ginn, Michel Cloutier, Groupe D'Analyse**, « FICHE D'INFORMATION » - Utilisation excédentaire des ressources médicales due au tabagisme : Soins hospitaliers », 10 août 2010. http://cqct.gc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/DOCU_10_08_10_GroupeDAnalyse_Fiche_Hosp.pdf
- ^{xvi} Analyse des données de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (2008-2009), basée sur les estimés de marges de profits de **Santé Canada** avec une extrapolation pour le Québec. **Médecins pour un Canada sans fumée**, « Profiting from starter smokers ». <http://goo.gl/Y74m4I>
- ^{xvii} **Ministère de la Santé et des Services sociaux**, « Rapport sur la mise en oeuvre de la Loi sur le tabac 2005-2010 », page 33, octobre 2010. http://cqct.gc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/RAPP_10_10_18_RapportMiseEnOeuvreLoTabac_2010.pdf
- ^{xviii} Ricardo Oberlander pour **BAT**, Investor Day 2013: Americas. (voir diapo 12 de 21) [http://www.bat.com/group/sites/UK_8GLKJF.nsf/vwPagesWebLive/DO9BDMC5\\$FILE/Americas_Region.pdf?openelement](http://www.bat.com/group/sites/UK_8GLKJF.nsf/vwPagesWebLive/DO9BDMC5$FILE/Americas_Region.pdf?openelement)
- ^{xix} **Non-Smoker's Rights Association**. *Backgrounder on the Canadian Tobacco Market*, édition 2013. http://www.nsr-a-dnf.ca/cms/file/files/2013_Canadian_Tobacco_Market.pdf
- ^{xx} **Tariana Turia**, ministre déléguée à la Santé de la Nouvelle-Zélande, "Government moves forward with plain packaging of tobacco products", <http://www.beehive.govt.nz/release/government-moves-forward-plain-packaging-tobacco-products> ; **The Irish Sun**, "Ireland to become first country in Europe to restrict tobacco companies on packaging", <http://www.irishsun.com/index.php/sid/222782481/sca/aba4168066a10b8d/h/Ireland-to-become-first-country-in-Europe-to-restrict-tobacco-companies-on-packaging>
- ^{xxi} <http://folha.co.za/south-africa-plans-plain-cigarette-packaging-by-2015-minister/>
- ^{xxii} **GulfNews**, « Tougher measures to deter UAE smokers », 13 janvier 2014. <http://goo.gl/oics4p>
- ^{xxiii} <http://www.aihw.gov.au/alcohol-and-other-drugs/ndshs/2013/tobacco/>
- ^{xxiv} <http://www.tobaccolabels.ca/decline-in-smoking-rates-attributed-to-plain-packaging/>
- ^{xxv} <http://www.edmontonjournal.com/Bill+banning+flavoured+tobacco+passes+third+reading/9216288/story.html> ; http://www.thestar.com/news/queenspark/2013/11/13/ontario_bill_to_ban_sale_of_flavoured_tobacco_to_youth.html
- ^{xxvi} **Propel Center for Population Health Impact**. *Tobacco Use in Canada: Patterns and Trends*, édition 2014, page S-17.
- ^{xxvii} **Gouvernement du Québec**, « Budget 2013-2014 – Plan budgétaire », page A.48, juin 2014. <http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf>